



For more info

# TourTurf® Thatch-Less® FTD

## Fungi Thatch Degradar

Pakiet przeznaczony do degradacji strzechy na murawach sportowych i zapewnienia kontroli strzechy.



## Biopakiet przeznaczony do degradacji ligniny i kontroli strzechy.

TourTurf® Thatch-Less® FTD Fungi Thatch Degradar to w pełni rozpuszczalny w wodzie proszek z grzybami Trichoderma, biostymulantami i innymi korzystnymi mikroorganizmami, zapewniający biologiczną kontrolę strzechy na murawach sportowych.

Produkt jest w 100% organicznym produktem na bazie biologicznej zawierającym kombinację biostymulantów (kwas fulwowy i węglowodany), wyciąg z alg morskich jak również naturalne grzyby występujące w glebie oraz bakterie specjalnie przystosowane do przyspieszania naturalnej degradacji filcu i materiału organicznego w murawie.

Produkt ten zawiera 2 wysoce wydajne grzyby Trichoderma i 8 skutecznych mikroorganizmów zdolnych do degradacji celulozy, hemicelulozy oraz ligniny zwykle występujących w filcu oraz materii organicznej we wszystkich wszystkich powierzchniach murawach sportowych takich jak pola golfowe, green's, tee's, stadionach, boiskach piłkarskich i trawnikach.

Połączone bakterie i grzyby wytwarzają wysoki poziom mieszanych celulaz, a także lignazy i lakazy, które w połączeniu rozkładają włókna roślinne na cukry, które są następnie dostępne jako pokarm dla mikroflory w glebie.

Nasze szczepy mikroorganizmów są w pełni identyfikowalne poprzez analizę genomową (Odcisk palca DNA).

### Gwarantowana zawartość

Węglowodanów (dekstroza) ..... 15,0%  
Ekstraktu z glonów morskich ..... 1,0%  
Kwas fulwowy ..... 0,55%

#### "Thatch degrading" grzyby:

Trichoderma viridae ..... 2,25x10<sup>7</sup> KVE/g  
Trichoderma reesei ..... 2,65x10<sup>7</sup> KVE/g  
Łącznie..... 4,90x10<sup>7</sup> KVE/g

#### "Thatch degrading" mikroorganizmy:

Bacillus subtilis ..... 2,0x10<sup>8</sup> KVE/g  
Bacillus licheniformis ..... 1,0x10<sup>9</sup> KVE/g  
Bacillus amyloliquefaciens... 2,0x10<sup>8</sup> KVE/g  
Bacillus megaterium ..... 2,0x10<sup>8</sup> KVE/g  
Bacillus pumilus ..... 2,0x10<sup>8</sup> KVE/g  
Bacillus polymyxa ..... 1,0x10<sup>8</sup> KVE/g  
Pseudomonas putida ..... 2,20x10<sup>8</sup> KVE/g  
Pseudomonas fluorescens 2,20x10<sup>8</sup> KVE/g  
Łącznie..... 2,34x10<sup>9</sup> KVE/g

pH: 7,5

Gęstość: 1,01

Dysze: Dysze natryskowe dla większych kropli.

Optymalne działanie produktu w zakresie temperatur od 15 do 30°C.

### Zastosowanie




2-4 razy do roku przy temperaturze powyżej 10°C.



**Redukcja strzechy:** 2 kg/ha mieszane z 700 L wody.  
**Zwalczanie chorób:** 4kg/ha mieszane w 700 L wody.

**Stosowanie:** Wlać do 10 L ciepłej wody (35°C.) na kg produktu. Wlać mieszanie do sita, a następnie do zbiornika opryskiwacza z włączonym mieszaniem. Synergia z OXT, ETD, EXC & MCB



### Numer zamówienia

8593  
2 x 1 kg na karton

**Thatch-Less®**  
Organic Matter Control